

岐阜民医連 高血圧治療ガイドライン2013

2013.06 (2014.07改)

県連薬事委員会

		55歳未満	55歳以上
第1選択薬		ACE阻害剤	Ca拮抗剤/利尿剤
	推奨薬剤	エナラプリル錠	(アムロジピン錠、ニトレナール錠、 シルニジピン錠、ベニジピン錠) /ナトリックス錠
2剤併用療法		ACE阻害剤+Ca拮抗剤/利尿剤	Ca拮抗剤/利尿剤+ACE阻害剤
	推奨薬剤	エナラプリル錠+ (アムロジピン錠、ニトレナール錠、 シルニジピン錠、ベニジピン錠) /ナトリックス錠	(アムロジピン錠、ニトレナール錠、 シルニジピン錠、ベニジピン錠) /ナトリックス錠+エナラプリル錠
3剤併用療法		ACE阻害剤+Ca拮抗剤+利尿剤	
	推奨薬剤	エナラプリル錠+ (アムロジピン錠、ニトレナール錠、 シルニジピン錠、ベニジピン錠) +ナトリックス錠	

※ なお「高血圧治療ガイドラインJSH2014年」では、利尿剤が第1選択薬から除外される予想(2011年にはβ遮断剤が除外されている)
 AB/CD → A/CD → A/C という流れ
 (※ここでの / は、55歳ラインを意味する)

■ ARB には ACE阻害剤 を超える効果はない

「ARB+ACE阻害剤 併用」も「ACE阻害剤増量 単独」と同じ
 ARBはACE阻害剤が副作用で使用できない場合に限る
 (ジェネリックが発売されるまで)