

岐阜民医連 約束処方一覧 (内服)

2015.04改訂

熱・咳・痰	
ヒスノン600 (コメブ)分3/分3	
ブルフェン200	3T
メジコン15	6T
アンブロキシソール15	3T
レバミピド100	3T

喘鳴	
TM (コムN) 4.0/分3	
コンボン細粒1%	1.0
ムコダインDS50%	3.0

下痢	
BT (ミタ) 6/分3	
タンニン酸アルブミン	3.0
ビオスリー配合散	3.0

熱・咳・痰	
ヒスノン300 (コメブ)/分3	
ブルフェン100	3T
メジコン15	3T
アンブロキシソール15	3T
レバミピド100	3T

咳・痰	
MA錠6 /分3	
メジコン15	6T
アンブロキシソール15	3T

炎症・疼痛	
LM /分3	
ロキソプロフェンNa錠	3T
レバミピド100	3T

咳 妊可・乳注 小児中止	
ブロコデS(オセ)25mL/分3	
オピセゾールロコティン	6.0
セネガシロップ	19.0

咳・痰	
MA錠3 /分3	
メジコン15	3T
アンブロキシソール15	3T

掻痒	
U散 (テワ) 3/分3	
テルギンGDS0.1%	2.0
ワッサーV配合顆粒	1.0

咳込 寝る前 小児中止	
セキP (アリ)1.5/分1	
アタラックスP 10%	0.5
リン酸ジヒコデ散1%	1.0

咳・痰	
MA 散(アム) 4/分3	
アスベリン散10%	1.0
小児用ムコソルバンDS1.5%	3.0

熱・咳・痰・鼻⇒ヒスノン+(オロパタジン錠5mg or ゼスラン錠3mg or ベネン錠1mg)  
 咳・痰・鼻⇒ MA錠 +(オロパタジン錠5mg or ゼスラン錠3mg or ベネン錠1mg)  
 ※ゼスラン錠3mg、ベネン錠1mgは安価希望者のみ

嚔下困難者の咳・痰・鼻  
 PWR(メペム)⇒ MA散 + テルギンGDS0.1%  
 FH(アポメ) ⇒ PL配合顆粒 + アスベリン散10%

岐阜民医連 約束処方一覧 (外用)

2014.08改訂

搔痒 レメプラ 50	
1-メントール	1.25
レスタミンコーワクリーム	25
プラスチックベース	25

口内炎 ヘルペス液 7	
デカドロン錠0.5mg	1.0
キシロカインビスカス2%	2
グリセリン液	2.5
精製水	2.5

年齢	～2	3～5	6～
発作時	Vb1	Vb2	Vb3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
ブロムヘキシシン吸入0.2%	0.35	0.5	0.7
生理食塩液	0.5	0.7	1.0
全量	1.0	1.4	2.0

保湿 プロペトベース (ププ) 50	
プラスチックベース	47.5
プロペト	2.5

口唇のあれ グリセリン50% 20	
グリセリン液	10
精製水	10

予防	VI1	VI2	VI3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
インターナル吸入液1%	1A	1A	1A

帯状疱疹 ボチカイン (アアミ) 20	
亜鉛華軟膏	10
アミノ安息香参エチル軟膏	10

超ネブ用吸入液		
U-Vb3	10	500
ベネトリン吸入液0.5%	0.2	10
ブロムヘキシシン吸入0.2%	1.8	90
生理食塩液	8.0	400

発作時	Va1	Va2	Va3
ベネトリン吸入液0.5%	0.15	0.2	0.3
アレバール吸入0.125%	0.85	1.2	1.7
全量	1.0	1.4	2.0

鼻閉 プリビナ小児用 3	
プリビナ液0.05%	1
精製水	2

超ネブ用吸入液		
U-Va3 10ml	10	500
ベネトリン吸入液0.5%	0.2	10
アレバール吸入0.125%	1.8	90
生理食塩液	8.0	400

発作時	DS1	DS2
	15kg未満	15Kg以上
デカドロン注射液1.65mg	0.2	0.3
ボスミン注1mg	0.5	1
生理食塩液	1.3	0.7
全量	2	2

HS-E 20ml 高張Na-Epinephrine液	
10%NaCl注射液	8.0
ボスミン注1ml	1A
注射用蒸留水	11.0

ネブライザー用吸入液		
Vb3	2	100
ベネトリン吸入液0.5%	0.3	15
ブロムヘキシシン吸入0.2%	0.7	35
生理食塩液	1.0	50

メプチン吸入液 ユニット0.3ml	1滴	3滴	4滴	1本
	0.05	0.15	0.2	0.3

胃粘膜染色液 100mL	
インジゴカルミン 0.15	0.15
精製水	適
全量	100

ネブライザー用吸入液		
Va3	2	100
ベネトリン吸入液0.5%	0.3	15
アレバール吸入0.125%	1.7	85

食道粘膜染色液3%ルゴール液100mL	
ヨウ素	3
ヨウ化カリウム	6
精製水	適量